

SULFARINOL®

Krople do nosa

Uwolnij swój oddech



SULFARINOL
(50 mg + 1 mg)/ ml



SULFARINOL (50 mg + 1 mg)/ ml

krople do nosa

Skład jakościowy i ilościowy

1 ml kropli do nosa zawiera 50 mg sulfatiazolu (Sulfathiazolum) i 1 mg nafazolinu azotanu (Naphazolini nitras). Jedna kropla zawiera około 2,5 mg sulfatiazolu i 0,05 mg azotanu nafazolinu.

Postać farmaceutyczna

Krople do nosa. Biały, oleisty płyn

Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe, doraźne leczenie objawów przekrwienia błony śluzowej nosa - kataru, uczucia zatkania nosa, obrzęku błony śluzowej nosa, spowodowanych przez stan zapalny związany z zakażeniem bakteryjnym.

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: do każdego otworu nosowego 1 do 2 kropli co 4 do 6 godzin. Lek należy zakropić do każdego otworu nosowego na skrzydełko nosa, następnie kilkakrotnie zacisnąć nos palcem wskazującym i kciukiem. Przed użyciem wstrząsnąć. Leku nie należy stosować częściej niż co 4 godziny i nie dłużej niż 3 do 5 dni. Inne sposoby dawkowania można stosować wyłącznie na zlecenie lekarskie.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- Uczulenie na sulfonamidy
- Jaskra z zamkniętym kątem przesączania
- Nieżyt nosa wysychający
- **Wiek poniżej 12. roku życia**

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni, z powodu możliwości wtórnego nasilenia obrzęku i kataru a także wystąpienia trwałych zmian w nabłonku. Ostrożnie stosować w następujących przypadkach:

leczenie inhibitorami MAO i trój pierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi; cukrzyca; astma oskrzelowa; nadciśnienie; choroby tarczycy; choroby układu krążenia (zwłaszcza w przypadku zaburzeń rytmu); stwardnienie tętnic mózgu; przerost gruczołu krokowego.

Miejscowy ból, brak poprawy, nasilenie miejscowych zmian nabłonka oraz krwawienie z nosa są wskazaniem do przerwania stosowania leku. Należy zachować szczególną ostrożność u chorych w podeszłym wieku.

Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z polietylenu z zakraplaczem i nakrętką 20 ml

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



**PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**
Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy „GALENUS”
03-791 Warszawa ul. Hutnicza 8
tel. 22 6782519, 22 6782601 faks 22 6782601

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
R/3321